

ESCALA DE CONOCIMIENTOS SOBRE VIH Y OTRAS ITS (ECI)
(Espada, Guillén-Riquelme, Morales, Orgilés, & Sierra, 2014)

Por favor, señale en cada afirmación si es verdadera o falsa. Si desconoce la respuesta marque “No lo sé”.

	Falso	Verdadero	No lo sé
1. El SIDA es causado por un virus llamado “VIH”.	1	2	3
2. La principal vía de transmisión del VIH en Colombia es a través de las relaciones sexuales.	1	2	3
3. Una mujer seropositiva embarazada puede transmitir el VIH a su bebé.	1	2	3
4. El VIH se transmite exclusivamente por medio de fluidos vaginales, seminales y la sangre.	1	2	3
5. El VIH se transmite a través del aire.	1	2	3
6. Es peligroso compartir alimentos o agua con personas seropositivas o con SIDA.	1	2	3
7. Lavar la ropa con la de un seropositivo o con SIDA implica riesgo de contraer la enfermedad.	1	2	3
8. Existe riesgo de contraer el VIH por compartir jeringas usadas.	1	2	3
9. El VIH afecta al sistema inmunológico humano.	1	2	3
10. El periodo ventana es el tiempo que tarda el cuerpo en producir anticuerpos tras la transmisión de VIH.	1	2	3
11. Tanto el anillo vaginal como el DIU (T de cobre) son métodos eficaces para evitar el VIH/SIDA.	1	2	3
12. Las pastillas anticonceptivas son eficaces para prevenir la transmisión del VIH en las relaciones sexuales.	1	2	3
13. El condón es un método eficaz para evitar la transmisión del VIH.	1	2	3
14. El condón femenino es tan eficaz como el condón masculino para evitar la transmisión del virus del VIH/SIDA.	1	2	3
15. Dar un beso con lengua a una persona seropositiva es un riesgo para la transmisión del VIH.	1	2	3
16. Abrazar y besar en la mejilla a una persona seropositiva implica riesgo de transmisión del VIH.	1	2	3
17. Practicar la penetración vaginal “viniéndose fuera” es una forma segura de practicar sexo sin riesgo de infección por VIH.	1	2	3
18. La prueba de detección del VIH se suele realizar mediante un análisis de sangre.	1	2	3
19. Cuando alguien tiene Gonorrea o Gonococia no es necesario tratar a su pareja sexual.	1	2	3
20. La Gonorrea o Gonococia se cura sola en la mayoría de los casos.	1	2	3
21. La Sífilis es una enfermedad prácticamente desaparecida.	1	2	3
22. La Sífilis puede dejar lesiones permanente si no se trata rápidamente.	1	2	3
23. Actualmente el contagio de la Sífilis es muy difícil.	1	2	3
24. La Hepatitis B nunca deja secuelas.	1	2	3

La escala busca evaluar cuatro dimensiones relacionadas con los conocimientos sobre el VIH y otras ITS. A continuación se exponen las cuatro dimensiones con los ítems que corresponden a cada una de éstas:

- ✓ **Conocimientos transmisión VIH:** Hace referencia a los conocimientos que se tienen sobre las maneras en cómo el VIH específicamente puede transmitirse. Los ítems correspondientes son: 5, 6, 7, 15 y 16.
- ✓ **Conocimiento otras ITS:** Hace referencia a conocimientos generales que se tienen alrededor de otras ITS diferentes al VIH, como lo pueden ser la gonorrea, sífilis, hepatitis, etc. Los ítems correspondientes son: 19, 20, 21, 22, 23 y 24.
- ✓ **Conocimiento general VIH:** Se refiere a los conocimientos básicos sobre VIH, diferentes a mecanismos de transmisión. Los ítems correspondientes son: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 y 18.
- ✓ **Conocimiento sobre preservativo:** Hace referencia al conocimiento sobre la eficacia que tiene el preservativo –femenino o masculino- para prevenir la infección por VIH de forma sexual. Los ítems correspondientes son: 13 y 14.
- ✓ **Conocimientos prevención VIH:** Se refiere a métodos anticonceptivos que no previenen de ninguna manera la infección por VIH u otras ITS. Los ítems correspondientes son: 11, 12 y 17.

Los aciertos se distribuyen en la respuesta de “verdadero” o “falso” que haga la persona de acuerdo al ítem. La respuesta “no lo sé” siempre será un error. Los aciertos se muestran en los ítems de la siguiente manera:

- ✓ **Ítems verdaderos:** 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 13, 14, 18 y 22.
- ✓ **Ítems falsos:** 5, 6, 7, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23 y 24.